



SANIUM SPRAY

ΕΣΥΓΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ετοιμόχρηστο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής, για ερασιτεχνική χρήση σε σολανώδη, κολοκυνθοειδή και καλλυπτικά φυτά θερμοκηπίου.

Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knockdown effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα.



Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα (AL)

Εγγυημένη σύνθεση: Flupyradifurone 0.0080 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 99.9917 % β/β
Τοξικό για τους υερόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμος φυλλώματος, μέχρι απορροής. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται από απόσταση 30 εκ. από τη φυλλική επιφάνεια. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

UF: 6C10-AC2Y-1H78-2XKS

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θερμοκηπίου) Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Αφίδες	Ψεκάσμος φυλλώματος μέχρι απορροής. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται από απόσταση 30 εκ. από τη φυλλική επιφάνεια. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θερμοκηπίου) Αγγούρι, Κολοκύθι	Αφίδες, Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Παρλατόρια	
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (θερμοκηπίου)	Αφίδες, Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Παρλατόρια	

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΦΑΡΜΑΧΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δραβόκη 65, 17672, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 2108623144

Κάτοχος της άδειας:
SBM DEVELOPPEMENT SAS
60 Chemin des Mouilles,
69130 Ecullly, Γαλλία

Διανομή:
ΕΛΛΗΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231
Χαλάνδρι, Τηλ: 2130065070



A.A.Δ.Α.: 14762/ΕΡ/07.12.2020
559264GRa



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε οδύσπασια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία : Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας μπορεί να γίνει πλύση στομάχου μόνο εντός των δύο (2) πρώτων ωρών από την κατάποση. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ωφέλιμα έντομα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ετοιμόχρηστο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής, για ερασιτεχνική χρήση σε σολανώδη, κολοκυνθοειδή & καλλυπτικά φυτά θερμοκηπίου.

Δρα δευτερευόντως τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος του εντόμου με αποτέλεσμα την διατάραξη του νευρικού συστήματος και το θάνατο του εντόμου.

Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knockdown effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα.

Το σκεύασμα έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Προϊόν έτοιμο για χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Δε χρησιμοποιείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθεύονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμος φυλλώματος μέχρι απορροής. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται από απόσταση 30 εκ. από τη φυλλική επιφάνεια. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (θερμοκηπίου) – Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά / ΚΟΛΟΚΥ ΝΘΟΕΙΔΗ (θερμοκηπίου) – Αγγούρι, Κολοκύθι: Για την αντιμετώπιση των:

Αφίδες, Δόση: 90 κ.εκ./m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ., 120 κ. εκ./m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ., 150 κ. εκ./m² όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:**

Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (θερμοκηπίου): Για την αντιμετώπιση των: Αφίδες, Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Παρλατόρια. **Δόση:** 90 κ.εκ./m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ., 120 κ. εκ./m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ., 150 κ. εκ./m² όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής, από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (BBCH >10). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

Παρατηρήσεις:

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλυπτικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Πιθανώς να προκαλέσει παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού. Δεν είναι φυτοτοξικό τις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκάσμο.
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι (σε περίπτωση μη ετοιμόχρηστου σκευάσματος).
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flupyradifurone, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχαστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ): 3 ημέρες
Καλλυπτικά (Θ) : Δεν ορίζονται.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως.