

PROVANTO SOIL

Ετοιμόχρηστοι Κόκκοι

Το Provanto Soil είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των σιδηροσκώληκων στην καλλιέργεια της πατάτας, του καρότου και του παντζαριού. Δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης με αποτέλεσμα παρατεταμένη διέγερση, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες. Το Provanto Soil είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.



Spinosad 0,1% β/β

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Πατάτα (SOLTU) Καρότο Πατζάρι	ΣΙΔΗΡΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (<i>Agriotes sp.</i> - AGRISP)	4.800 γρ. / στρ. ή 48 γρ. / 10 m ²	Εφαρμογή στο έδαφος κατά τη σπορά με διασκορπισμό κατά μήκος της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση. (BBCH 00)	1

Παρατηρήσεις: 1. Είναι απαραίτητη η καλή προετοιμασία του εδάφους (χωρίς σβόλους), για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. 2. Το Provanto Soil παρέχει προστασία ενάντια στους σιδηροσκώληκες σε έδαφος, όπου αναμένεται μικρή έως μέτρια πυκνότητα πληθυσμού των εντόμων.



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr



05/2023

SANIUM 25 SL:
Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14674/ΕΡ /24.08.2018

ΠΡΟΣΟΧΗ



SANIUM SPRAY:
Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14762/ ΕΡ/ 07.12.2020

ΠΡΟΣΟΧΗ



PROVANTO SOIL:
Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14766/ΕΡ /03.02.2021



DELTAM:
Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14.613/ 16.06.2017

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.



SANIUM 25 SL



SANIUM SPRAY



DELTAM



PROVANTO SOIL



αφίδες



κοκκοειδή



τζιτζικάκια



αφίδες



κοκκοειδή



αλευρώδεις



αφίδες



λεπιδόπτερα



κολεόπτερα



σιδηροσκώληκες

Για να απολαμβάνεις τον κήπο σου



SANIUM 25 SL

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Με στόχο τον έλεγχο σημαντικών μυζητικών εντόμων όπως αφίδες, κοκκοειδή, τζιτζικακία σε λαχανικά και σε καλλωπιστικά φυτά.



Flupyradifurone 2,5% β/ο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Μηλιά MABSD	ΑΦΙΔΕΣ <i>Aphis pomi</i> (ΑΡΗΙΡΟ), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis devecta</i> (DYSADE)	240 για ύψος κόμης 100 εκ. 480 για ύψος κόμης 200 εκ. 720 για ύψος κόμης 300 εκ.	25 – 50	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη άνθησης έως την έναρξη ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 60-79)	1
	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL)	160 για ύψος κόμης 80 εκ. 200 για ύψος κόμης 100 εκ. 240 για ύψος κόμης 120 εκ.	100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)	1
Αμπέλι VITVI	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI)	400	100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 12-89)	2
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (METFPR)		100		2
Σολανώδη Υπαίθρου (Υ) Τομάτα LYPXS Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	ΑΦΙΔΕΣ <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ), <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (ΜΑΚΣΕΥ)	360	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δευτέρου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	2/10
Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου (Υ) Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUURP, Καρπούζι CITLA, Κολοκύθα CCUMA	ΑΦΙΔΕΣ <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ)	450	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δευτέρου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	2/14
Μαρούλι (Υ) LACSA	ΑΦΙΔΕΣ <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (ΜΑΚΣΕΥ), <i>Myzus persicae</i> , (ΜΥΖΥΡΕ), <i>Uroleucon sonchi</i> (DACTSN), <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Acyrthosiphon sp.</i> (ACYRSP) <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ)	500	25 – 100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49)	1
Πατάτα SOLTU	ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	400	30-120	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από την εμφάνιση του πρώτου πλευρικού βλαστού της βάσης μέχρι την έναρξη της άνθησης. (BBCH 21-61)	1
Καλλωπιστικά (Υ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτόρια Δένδρων	ΑΦΙΔΕΣ <i>Aphis fabae</i> (ΑΡΗΙΦΑ), <i>Macrosiphum rosae</i> (ΜΑΚΣΡΟ), <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ), <i>Aphis spiraeicola</i> (ΑΡΗΙΣΙ), <i>Aphis nerii</i> (ΑΡΗΙΝΕ), <i>Macrosiphoniella sanborni</i> (ΜΑΚΡΧΗ)	240 για ύψος φυτού μέχρι 50 εκ.	90	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της βλάστησης (BBCH > 30)	2/7
		320 για ύψος φυτού από 50 έως 125 εκ.	120		
		400 για ύψος φυτού >125 εκ.	150		

SANIUM SPRAY

Ετοιμόχρηστο Εντομοκτόνο

Το Sanium Spray, είναι ένα ετοιμόχρηστο προϊόν. Χάρη στη δραστική ουσία flupyradifurone, δρα στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων, όπως προνύμφες, νύμφες και ακμαία. Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση, η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα.



Flupyradifurone 0,0080% β/ο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ σε κυβικά εκατοστά/ τετραγωνικό μέτρο (κ.εκ/τ.μ.)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θερμοκηπίου) Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ Θερμοκηπίου Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUURP	ΑΦΙΔΕΣ <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (ΜΑΚΣΕΥ) <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ)	90 κ.εκ./ m ² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ. 120 κ.εκ. / m ² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ. 150 κ.εκ./ m ² όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δευτέρου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89).	2
		90 κ.εκ./ m ² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ. 120 κ.εκ. / m ² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ. 150 κ.εκ./ m ² όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (BBCH > 10).	2
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Θερμοκηπίου	ΑΦΙΔΕΣ <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Aphis fabae</i> (ΑΡΗΙΦΑ), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (ΜΑΚΣΕΥ), <i>Macrosiphum rosae</i> (ΜΑΚΣΡΟ), <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ), <i>Myzus ascalonicus</i> (ΜΥΖΥΑΣ), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ΑΝΥΡΗΕ), ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (ΤΡΙΑΥΑ), <i>KOKKOEIΔH Saissetia coffeae</i> (SAISHE) <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (ΑΒΓΡΚΥ) <i>Lekánio Saissetia oleae</i> (SAISOL) <i>Parlatoria Parlatoria oleae</i> (PARLOL)			

Παρατηρήσεις: Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.



DELTAM

Ετοιμόχρηστο Εντομοκτόνο

Το Deltam είναι ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο για ερασιτεχνική χρήση σε κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά. Το εντομοκτόνο αυτό είναι επαφής και στομάχου, ανήκει στην οικογένεια πυρεθρινοειδών και είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων.



Deltamethrin 0,00075% β/ο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ κ.εκ./ τ.μ. (max)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ) Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανα (εκτός από το κινέζικο), Λαχαν. Βρυξελλών, Λαχανίδες, Γογγυλοκράμβες	ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i>), Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>), Κευθόρρυγχος (<i>Ceutorhynchus quadridens</i>), ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ <i>Phyllotreta sp.</i>	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	2
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ (Υ+Θ) εκτός από πλατύφυλλα αντίδια.	ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>), Πράσινο ακουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>), <i>Autographa gamma</i> , Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exiguus</i>)	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	3
ΦΑΣΟΛΙ	ΑΦΙΔΕΣ <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus sp.</i> ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>) ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ Σιτόνα (<i>Sitona lineatus</i>)	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες	2
ΑΡΑΚΑΣ	ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ Σιτόνα (<i>Sitona lineatus</i>)	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 μέρες	2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ)	ΑΦΙΔΕΣ <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphoniella sanborni</i> , <i>Phyllaphis fagi</i> . ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> . ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i> , <i>Pieris sp.</i>), Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>), <i>Autographa gamma</i> , <i>Autographa egeana</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis sp.</i>), <i>Orgyia antiqua</i>	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	5
ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΑΦΙΔΕΣ <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphoniella sanborni</i> , <i>Phyllaphis fagi</i> . ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> . ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i> , <i>Pieris sp.</i>), Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>), <i>Autographa gamma</i> , <i>Autographa egeana</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>), Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis sp.</i>), <i>Orgyia antiqua</i> . ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ <i>Lilioceris lili</i> , <i>Chrysolina americana</i> , <i>Meligethes aeneus</i> , <i>Phyllotreta sp.</i>	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	5