



# MINSK®

ζιζανιοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: **Flazasulfuron 25% β/β**,

Βοηθητικές ουσίες: **73,41% β/β**

**ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**

**Flazasulfuron**

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης

στην Αγορά: 70246 / 18.10.2017

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:**

**50 ΓΡ**

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. **SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: - να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **10 μέτρων**, σε αμπέλι και ελιά, **10 μέτρων**, με φυτική κάλυψη, σε εσπεριδοειδή, **20 μέτρων**, με φυτική κάλυψη, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. **SPe2:** Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%. **SPe3:** Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

UFI: VRGS-K17M-8058-U5P0

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Κάτοχος της άδειας: Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**, Λεωφόρος Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική, Τηλ.: 213 006 5000, e-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date) / Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.

**ΑΝΟΙΕΤΕ ΕΔΩ**



TKI-GR\_Minsk\_50g\_UFI\_17-09-24

## **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (φιάλες, κουτιά), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**  
**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με

διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** i. σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται, ii. σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν απαιτείται, iii. της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στη ετικέτα του σκευάσματος.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή

συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπ्लाστικής και συμπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ [ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ, ΚΙΤΡΑ, κ.α.]: Για Ετήσια**

**αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια** δόση 16 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, την άνοιξη – καλοκαίρι. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΕΛΙΑ:** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια δόση 16 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΑΜΠΕΛΙ:** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια

δόση 16 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10 – 40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΛΑΙ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ):** Για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια δόση 20 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10 – 40 λίτρα/στρ. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

## Παρατηρήσεις:

1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ ύψος.
3. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

## Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

**Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Αγρωστώδη:** Αγριοβρώμη (*Avena fatua*), Αγριοβρώμη (*Bromus sterilis*), Μουχρίσα (*Echinochloa crus-galli*), Ήρα (*Lolium* spp.), Πόα (*Poa annua*), Σετάριας (*Setaria verticillata*, *S. Viridis*, *S. Pumila*).  
**Πλατύφυλλα:** Βλήτο: (*Amaranthus retroflexus*), Καλεντούλα (*Calendula*

*arvensis*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Κόνυζα (*Conyza (Erigeron) canadensis*), Αγριοκαρότο (*Daucus carota*), Άγρια ρόκα (*Diploaxis erucoides*), Καπνόχορτο (*Fumaria* spp), Γεράνι (*Geranium dissectum*, *G. rotundifolium*), Λάμιο (*Lamium* sp.), Μολόχα (*Malva* sp), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Στύφνος (*Solanum nigrum*), Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale*), Τριφύλλι (*Trifolium* spp), Τσουκνίδα (*Urtica* spp.).

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (> 70% < 85%):** Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), Κύπερη (*Cyperus* spp.), Γαλατσίδα (*Euphorbia* spp), Ζωχοί (*Sonchus arvensis*, *S. oleraceus*), Βερόνικα (*Veronica persica*).

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):** Εσπεριδοειδή, Ελιά: 45 ημέρες. Αμπέλι: 75 ημέρες.

**Τρόπος εφαρμογής:** κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.



# MINSK®

ζιζανιοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: **Flazasulfuron 25% β/β**,  
Βοηθητικές ουσίες: **73,41% β/β**  
**ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**

**Flazasulfuron**

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης  
στην Αγορά: 70246 / 18.10.2017

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:  
50 ΓΡ**

\* TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**  
**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. **SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: - να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **10 μέτρων**, σε αμπέλι και ελιά, **10 μέτρων**, με φυτική κάλυψη, σε εσπεριδοειδή, **20 μέτρων**, με φυτική κάλυψη, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. **SPe2:** Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%. **SPe3:** Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

UFI: VRGS-K17M-8058-U5P0  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Κάτοχος της άδειας: **Albaugh TKI d.o.o.** Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**, Λεωφόρος Μεσογείων 335,  
15231, Χαλάνδρι, Αττική, Τηλ.: 213 006 5000, e-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)  
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date) / Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

TKI-GR\_Minsk\_50g\_BS\_17-09-24



# MINSK®

## Ζιζανιοκτόνο

**Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία:**  
**Flazasulfuron 25% β/β, Βοηθητικές ουσίες:**  
**73,41% β/β**

**ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**  
**Flazasulfuron**

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ**  
**ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ**  
**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ**  
**ΧΡΗΣΤΕΣ**  
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ**  
**ΠΑΙΔΙΑ**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:**  
**70246 / 18.10.2017**

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 20x50 ΓΡ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**UFI: VRGS-K17M-8058-U5P0**

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P501:** Διάθεση περιχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. **SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). **SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: - να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **10 μέτρων**, σε αμπέλι και ελιά, **10 μέτρων, με φυτική κάλυψη**, σε εσπεριδοειδή, **20 μέτρων, με φυτική κάλυψη**, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. **SPe2:** Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλήση μεγαλύτερη του 4%. **SPe3:** Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Κάτοχος της άδειας: Albaugh TKI d.o.o.** Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία  
**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,** Λεωφόρος Μεσογείων 335,  
15231, Χαλάνδρι, Αττική, Τηλ.: 213 006 5000, e-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)



TKI GR\_Minsk\_20x50g\_17/09/24

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date) / Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

©™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

**ALBAUGH®**  
your alternative