

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ρυθμιστή ανάπτυξης, μμηκτικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαιο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενθλιπώντας τους. Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) σε ωά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατηρούνται μεταμβρωτικές αλλαγές. β) αναστέλλει την μεταμόρφωση των προνυμφών. γ) προκαλεί παρεμπόδιση της έκδυσσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαιών και δ) έχει στεριωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με εντομοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η μετακίνηση της δραστηρικής ουσίας pyriproxifen στα φυτά είναι διαλασματική. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποση.

Πρώτες βοήθειες-Αντιδοτό: P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777**

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής ούτε σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. **Sp3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέσκαση ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 20 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 75%. Οπωρώνες: 25 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 75%. **Sp8:** Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης στην τομάτα (Θ) και μελιτζάνα (Θ), καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά. **Sp9:** Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση. **Sp5:** Αερσίστε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανείσοδο. **Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: Οι κλειδές/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (να νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποθεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και манταρινιά): Για **Κοκκοειδή Κόκκινη Ψώρα, Ασπιδιωτιά, Λεκάνιο, Μυτιλόμορφη Ψώρα, Παρλατόρια:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς, 1 εφαρμογή.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά-Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Πυρηνόκαρπα (δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσινιά, νεκταρινιά και ροδακινιά): Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50

PROXIMO® 10 EC

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο-ρυθμιστή ανάπτυξης, μμηκτικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

**Pyriproxifen (Πιριπροξιφέν)
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)**

Εγγυημένη σύνθεση: Pyriproxifen 10 % β/ο, Βοηθητικές ουσίες 88,97 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14513/25-05-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



KINΔYΝΟΣ

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Προφυλάξεις: P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P261:** Αποφεύγετε να αναπνεύετε εκκενώματα. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επαπέσοδο στον αγρό. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκηπίου. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **UF1: X2A0-U085-700T-7KNF**

Κάτοχος της έγκρισης:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21

SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231

Τηλ: 213 006 5000

E-mail: contact@elanco.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1 ΛΙΤΡΟ



*™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Κυδωνιά, Αχλαδόμυλα, Λωτός - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Τομάτα (θερμοκηπίου): Για **Αλευρώδεις:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαιών. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Μελιτζάνα (θερμοκηπίου) - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Αλευρώδεις:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαιών. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαιών αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το **PROXIMO 10 EC**. 2. **Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργειές ήσσονος σημασίας αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρδιά, καστανιά, κυδωνιά, αχλαδόμυλα, λωτός και μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που οφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογέμιες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, ούτε κάποιο άλλο σκεύασμα που περιέχει pyriproxifen, περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή κατά του αλευρώδη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Έχει σημασία πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυμφικά στάδια των εχθρών, κατά προτίμηση εναντίον προνυμφών πρώτου σταδίου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Φέριζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

Ουσιολογικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και ιδιαίτερα στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και манταρινιά): **30 ημέρες**. Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): **3 ημέρες**. Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, αχλαδόμυλα, λωτός, δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσινιά, νεκταρινιά, ροδακινιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρδιά και καστανιά: **Καλύπτετε από το χρόνο εφαρμογής (πριν την άνθηση).**

Συνδυαστικότητα: --

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



PROXIMO[®] 10 EC

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Pyriproxifen (Πιριπροξιφέν)
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: **Pyriproxifen 10 % β/ο**, Βοηθητικές ουσίες **88,97 % β/β**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14513/25-05-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Προφυλάξεις: P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επανείσοδο στον αγρό. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκηπίου. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **ΕUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: X2A0-U085-700T-7KNF

Κάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231
Τηλ: 213 006 5000
E-mail: contact@elanco.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

5 ΛΙΤΡΑ

ALBAUGH
your alternative

® trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



7 640166 486947 >

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμιαίο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους. Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) σε ωά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατρύχονται μετεμβρυακές αλλαγές, β) αναστέλλει την μεταμόρφωση των προνυμφών, γ) προκαλεί παρεμπόδιση της έκδοσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμιαίων και δ) έχει στερωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με εντομοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η μετακίνηση της δραστικής ουσίας ρυγίροχφυτα στα φυτά είναι διαλεκτατική. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποση.

Πρώτες Βοήθειες-Αντιδοτό: **P301+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Sp1: Μην ρυτύνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. **Spε3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφηστεί με ανάεκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 20 μέτρα να χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 75%. Οπωρώνες: 25 μέτρα να χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 75%. **Spε8:** Για να προστατέψετε τα έντομα επικινεστών στην τομάτα (Θ) και μελιτζάνα (Θ), καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά. **Spο2:** Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση. **Spο5:** Αφιερώστε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσουν το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανείσοδο. **Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται πλήρες ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και манταρινιά): Για **Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα, Ασπιδιώτες, Κεράνιο, Μυτιλοτρόφη ψώρα, Παρλατόρια:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασιός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. 1 εφαρμογή.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά)-Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασιός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση). **Πυρηνόκαρπα (δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσινιά, νεκταρινιά και ροδακινιά):** Για **Κοκκοειδή ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού

(50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασιός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση). **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** Για **Κοκκοειδή ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασιός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Λωτός -Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασιός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Τομάτα (θερμοκήπιο): Για **Αλευρώδες:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασιός με την εμφάνιση των πρώτων ακμιαίων. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Μελιτζάνα (θερμοκήπιο) - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Αλευρώδες:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασιός με την εμφάνιση των πρώτων ακμιαίων. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμιαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το **PROXIMO 10 EC**. 2. **Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργήσιμες ήσσονος σημασίας αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός και μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτολογικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, ούτε κάποιο άλλο σκεύασμα που περιέχει ρυγίροχφυτη, περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή κατά του αλευρώδη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργασία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασιός πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυμφικά στάδια των εχθρών, κατά πρότιμημη εναντίον προνυμφών πρώτου σταδίου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μείση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συσσωσμένες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και манταρινιά): **30 ημέρες**, Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): **3 ημέρες**, Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός, δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσινιά, νεκταρινιά, ροδακινιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά και καστανιά: **Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (πριν την άνθηση).**

Συνδυαστικότητα: --.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαιο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους. Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) σε ωά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκόλαψη περιτριάζει ή επιβραδύνει και παρατηρούνται μετεβρυσάκες αλλαγές. β) αναστέλλει την μεταμόρφωση των προνυμφών. γ) προκαλεί παρεμπόδιση της έκδυσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαιών και δ) έχει στεριωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη υστωκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με εντομοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η μετακίνηση της δραστικής ουσίας ρυγίροχψην στα φυτά είναι διελασματική. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποση.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: P301+P310: Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **P302+P352:** Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P305+P351+P338:** Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. **Sp3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασβεστώη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 20 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%. Οπωρώνες: 25 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%. **Sp8:** Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης στην τομάτα (Θ) και μελιτζάνα (Θ), καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά. **Sp2:** Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση. **Sp5:** Αερσίστε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσουν το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανεπίσωση. **Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και την συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και μανταρινιά): Για **Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα, Ασπίδα, Λεκάνια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Παρλατόρια:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. 1 εφαρμογή.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά)-Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Πυρηνόκαρπα (δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, νεκταρινιά και ροδακινιά):

PROXIMO® 10 EC

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Ρυγίροχψην (Πιρπροξιφέν)
Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: **Pyriproxyfen 10 % β/ο, Βοηθητικές ουσίες 88,97 % β/β**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14513/25-05-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Προφυλάξεις: P405+P102:** Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P261:** Αποφύγετε να αναπνεύσετε εκνεφώματα. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομική προστασία για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επανεπίσωση στον αγρό. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή Φοράτε προστατευτικό ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκήπιου. **P501:** Διάθεση περιχοιών/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **EUH401:** Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **UFI: X2A0-U085-700T-7KNF**

Κάτοχος της έγκρισης:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Grajbski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231
Τηλ: 213 006 5000
E-mail: contact@elanco.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
500 Κ.ΕΚ



Albaugh your alternative

Albaugh is a trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Μηλιδοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Λωτός - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Τομάτα (θερμοκήπιου): Για **Αλευρώδη:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση των πρώτων ακμαιών. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Μελιτζάνα (θερμοκήπιου) - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Αλευρώδη:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μ.έγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση των πρώτων ακμαιών. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαιών αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το PROXIMO 10 EC. 2. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός και μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, ούτε κάποιο άλλο σκεύασμα που περιέχει ρυγίροχψην, περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή κατά του αλευρώδη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμοι πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυμφικά στάδια των εχθρών, κατά προτίμηση εναντίον προνυμφών πρώτου σταδίου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόμενα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και μανταρινιά): **30 ημέρες.** Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): **3 ημέρες.** Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός, δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, νεκταρινιά, ροδακινιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά και καστανιά: **Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (πριν την άνθηση).**

Συνδυαστικότητα: --

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

PROXIMO® 10 EC

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Ρυγίροξυφεν (Πιριπροξυφέν)
Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Ρυγίροξυφεν 10 % β/ο, Βοηθητικές ουσίες 88,97 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην ΑΑΔΑ: 14513/25-05-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Προφυλάξεις P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P261:** Αποφεύγετε να αναπνεύετε εκνεφώματα. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επανεισδο στον αγρό. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκηπίου. **P501:** Διαθέσει περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **ΕΥΗ401:** Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **UF1:** X2A0-U085-700T-7KNF

Κάτοχος της έγκρισης: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Υπευθυνός για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231,
Τηλ: 213 006 5000, E-mail: contact@elanco.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

250 Κ.ΕΚ

ALBAUGH®
your alternative

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
βλέπε επί της συσκευασίας

* ** trademark or trade name of Albaugh LLC or an affiliated company



Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαιο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικιώσθη τους. Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) σε ωά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατηρούνται μετεμβρυακές αλλαγές, β) αναστέλλει την μεταμόρφωση των προνυμφών, γ) προκαλεί παρεμπόδιση της έκδυσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαίων και δ) έχει στεριωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με εντομοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους. Η μετακίνηση της δραστικής ουσίας ρυγίροξυφεν στα φυτά είναι διελασματική. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποση.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. **Sp3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφηστέ μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 20 μέτρα να χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%. Οπωρώνες: 25 μέτρα να χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%. **Sp8:** Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης στην τομάτα (Θ) και μελιτζάνα (Θ), καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά. **Sp2:** Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση. **Sp5:** Αερίστε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανείσδο. **Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (να νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστρέφονται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και μανταρινιά): Για **Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα, Ασπίδιωτς, Λεκάριο, Μυτιλόμορφη ψώρα, Παρλατόρια:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. 1 εφαρμογή.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά)-Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Πυρηνόκαρπα (δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, νεκταρινιά και ροδακινιά): Για **Κοκκοειδή**

Ψώρα του Σαν Ζοζέ: 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Λωτός - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση).

Τομάτα (θερμοκηπίου): Για **Αλευρώδη:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Μελιτζάνα (θερμοκηπίου) - Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **Αλευρώδη:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.)). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών.

Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το PROXIMO 10 EC. 2. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός και μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, ούτε κάποιο άλλο σκεύασμα που περιέχει ρυγίροξυφεν, περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή κατά του αλευρώδη.

Χρόνος διάστησης ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυμφικά στάδια των εχθρών, κατά προτίμηση εναντίον προνυμφών πρώτου σταδίου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, λάιμ, γκρέιφρουτ και μανταρινιά): **30 ημέρες.** Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): **3 ημέρες.** Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός, δαμασκηνιά, κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, νεκταρινιά, ροδακινιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά και καστανιά: **Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (πριν την άνθηση).**

Συνδυαστικότητα: --.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



PROXIMO[®] 10 EC

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Pyriproxyfen (Πιριπροξιφέν)
Υγρό γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: **Pyriproxyfen 10 % β/ο**, Βοηθητικές ουσίες **88,97 % β/β**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14513/25-05-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Προφυλάξεις: P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επανείσοδο στον αγρό. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκηπίου. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: X2A0-U085-700T-7KNF

Κάτοχος της έγκρισης:


Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 12
SI-2327 Rače, Σλοβενία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231
Τηλ: 213 006 5000, E-mail: contact@elanco.gr

TKI GR Proximo_10_EC_Bux_16.12.21 SE 1668 GR 102 801



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
βλέπε επί της συσκευασίας





PROXIMO[®] 10 EC

Εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Pyriprooxyfen (Πιριπροξιφέν)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyriprooxyfen 10 % β/ο, Βοηθητικές ουσίες 88,97 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14513/25-05-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Προφυλάξεις: P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκκενώματα. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επανείσοδο στον αγρό. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκηπίου. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: X2A0-U085-700T-7KNF

Κάτοχος της έγκρισης: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231, Τηλ: 213 006 5000, E-mail: contact@elanco.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: βλέπε επί της συσκευασίας

® trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

