

Avadex[®] Factor

Εναιώρημα μικροκαψουλών (CS)

Εγγυημένη σύνθεση: Tri-allate: 45% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 58,01% β/β

CW21-80A9-U00D-CN4R

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΣΕ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΙ



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (CAS No. 2634-33-5)
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

A.A.Δ.A.: 70553/ 11.09.2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10L

Κάτοχος της άδειας:
Gowan Crop Protection Limited,
Rothamsted Research, West Common Harpenden
Hertfordshire AL5 2JQ, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογειών 335,15231, Χαλάνδρι,
Τηλ.: 2130065070

Gowan[®]
CROP PROTECTION LIMITED



ΔΙΑΧΕΙΡΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πιείτε ή καπνίσετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης / φόρτωσης και της εφαρμογής του προϊόντος.» «Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνιο πουκάμισο και γάντια.» «Για την προστασία των κατοίκων και των περιωκών να αφήσετε μια αεθακάρη ζώνη προστασίας από την κατοικημένη περιοχή 10 μέτρων, να ταχοχρόνη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.» «Διαβάστε τον περιεχόμενο / περιεχόμενο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμούς του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΣ: 210 77 93 777**

Για να αποβύθουτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη σκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφυγεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόν που περιέχουν δ.ο. tri-allate περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε αποστραγγιζόμενα εδάφη. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Επικινδύνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνια μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτων στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντάς. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητο ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΓΟΡΩΤΑΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΛΣΙΑΣ:** Τα κενά υλικά σκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (να νερά του ξέπλυσματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια αφού καταστράφουν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, σε ατίρα και κριθάρι. Η δραστική ουσία tri-allate δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των λιπιδίων.

Απορροφάται από τους σπόρους, τους βλαστούς και τις ρίζες των ευαίσθητων ζιζανίων, αναστέλλοντας την ανάπτυξή τους. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ομοιομόρφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά της καλλιέργειας και προφυτρωτικά των ζιζανίων με μηχανοκίνητα μέσα, με 35 – 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα, μέσο τύπου ακούπας, πίεση ψεκαστικού χού μεγαλιόλιθρη από 3 επιμοσφαιρες (45 psi) υπό υπό συνεχής ανάδευση. **ΘΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ:** **ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΤΑΡΙ (Μαλακό/Ξηλόρα):** Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων. **Δόση:** 360 κ.εκ.ακ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 35-40 λίτρα/ στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά της καλλιέργειας. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά κ.λ.π. περίοδο:** 1 εφαρμογή κάθε 3 χρόνια. **ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ:** Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων. **Δόση:** 360 κ.εκ.ακ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 35-40 λίτρα/ στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά της καλλιέργειας. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά κ.λ.π. περίοδο:** 1 εφαρμογή κάθε 3 χρόνια. **Παρατηρήσεις:** 1. Αποφύγετε την διασπορά σταγονιών του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες. 2. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας και προφυτρωτικά των ζιζανίων. 3. Η χρήση στο Χειμερινό ατίρα περιλαμβάνει τις χρήσεις: Σίτος μονόκοκκος, Σίτος δίκοκκος, Σίτος σπέلتα και Triticale.

* **ΚΑΤΑΦΛΟΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Ευαίσθητο ζιζάνιο:** Μικροκάρχη φάληρα (Phalaris minor) Κονή πάα (Poa annua). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Αγριοβρώμη (Avena fatua) Πολύανη ήρα (Lolium multiflorum). **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περιοχή μπορούν να σπαρθούν μόνο χειμερινό ή ανοιχτόκοκο κριθάρι, μετά από όργωμα. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Στον ίδιο αγρό, μπορεί να σπαρθεί βρώμη ή αγρωστώδεις καλλιέργειες ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του σκευασματος με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί όργωμα του εδάφους. Μη σπέρνετε αγρωστώδεις καλλιέργειες μετά την εφαρμογή του προϊόντος στους αγρούς. Είναι ασφαλές να σπείρετε τριφύλλι και άλλα όσπρια. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στην επιφάνεια του εδάφους. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ:** **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία Tri-allate, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 8 κατά HRAC. Μόνο οι κόκκοι αταρίου και κριθαριού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ζωτροφές μέσα από την εφαρμογή του προϊόντος. Να μην χρησιμοποιείται ως ζωτροφή ή χορτονομή από τις καλλιέργειες αταρίου και κριθαριού. **Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:** • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να εφαρμόζονται καλλιεργητικές τεχνικές, όπως αμειψισπορά, μη χημική καταπολέμηση κ.λπ. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστάμενες δόσεις και καλλιέργειες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Χειμερινό ατίρα, Ξηλόρα ατίρα, Σίτος ο μονόκοκκος, Σίτος ο δίκοκκος, Σίτος σπέلتα, Triticale, Χειμερινό κριθάρι. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευασματος. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.