

📌 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

TANISER

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε φόρμα εργασίας, μάσκα, γάντια και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φύρτωση και όταν εφαρμόζετε το σκεύασμα.
Πλυθείτε καλά μετά το χειρισμό.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλυστικό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες 5 °C έως 35 °C. Το σκεύασμα υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά ή ισχυρά όξινα σκευάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν μη-ηλεκτρικά μεταλλικά ιόντα σιδήρου, μαγνησίου, ψευδαργύρου, χαλκού ή κοβαλτίου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγυώμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχό μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβείτε τις συνιστώμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

servalesa®



TANISER


ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Φυσικό εκχύλισμα τανινών φυτικής προέλευσης, με ακόρεστα οργανικά οξέα, υπό μορφή άλατος καλίου. Ενισχύει την ποιότητα της παραγωγής βελτιώνοντας το τελικό μέγεθος και τη συνεκτικότητα των καρπών.

Το **TANISER** διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών στα Οπωροφόρα (Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, κ.τ.λ.), Ακτινίδιο, Εσπεριδοειδή, Αμέλι, Φράουλα, Σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.τ.λ.), Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι κ.τ.λ.), Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.).

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών (σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004, ΦΕΚ 35/Β/16-01-2004)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



Rev03-022024

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **TANISER** είναι ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών. Περιέχει τανίνες (πολυφαινόλες φυτικής προέλευσης) και ακόρεστα οργανικά οξέα που προάγουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και παρέχουν προστασία από ακραίες συνθήκες του περιβάλλοντος. Διεγείρει τη φυτική ανάπτυξη και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων καρπών, αυξάνοντας το τελικό τους μέγεθος και τη συνεκτικότητα. Η έναρξη της συνεκτικότητας των καρπών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε αρκετές καλλιέργειες (π.χ. φράουλα), καθώς ενισχύει την αντοχή τους κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και αυξάνει τη διάρκεια ζωής στο ράφι (shelf-life). Το **TANISER**, τέλος, αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες αβιοτικού στρες).

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ξηρή ουσία:	33% β/β
Ακόρεστα οργανικά οξέα:	6% β/β
Συμπυκνωμένες τανίνες (κατεχίνες):	3% β/β
Μορφή:	Υδατικό διάλυμα (SL)
Πυκνότητα:	1,1 g/ml (20 °C)
pH	6,5
EC	20 mS/cm

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται διαφυλλικά, με δόση 250-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (250-300 κ.εκ / στρέμμα).

Χρόνος εφαρμογής:

Καλλιέργεια	Χρόνος εφαρμογής
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Από την πτώση των πετάλων (BBCH 69) έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού (BBCH 73, στάδιο 2ης καρποποίησης).
Αμέλι	Από την πλήρη άνθηση έως την ωρίμανση.
Φράουλα (Υπαίθρου + Θερμοκηπίου)	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.
Ακτινίδιο	Προσνικό στάδιο (εμφάνιση ταξιανθίας) (BBCH 51-59).
Εσπεριδοειδή	Από την πτώση των πετάλων (BBCH 71) έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού (BBCH 85, στάδιο 2ης καρποποίησης).
Σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.τ.λ.)	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.
Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι κ.τ.λ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.
Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.

Χρόνος εφαρμογής: Συνιστώνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές ανά καλλιερητική περίοδο με μεσοδιάστημα 10 -15 ημερες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό πριν την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος.
- Ψεκάστε με καλή διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας.
- Εφαρμόστε το προϊόν αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.
- Κατά προτίμηση εφαρμόζεται το πρωί ή αργά το απόγευμα για την αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.



Αντιπρόεδρος Διοικήσεως:
ΕΛΑΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ: 2130065000

1L

Καθαρό βάρος:
1,1 kg ±2%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ
ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ

Παρασκευάζεται από:

servalesa®

CALLE DE LA PINADETA, 26
46930 QUART DE POBLET
VALENCIA - ESPAÑA

TEL.: +34 96 269 10 90
WWW.SERVALESA.COM