



TANISER

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.

servalesa®

50
χρόνια ΕΛΑΝΚΟ



ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ξηρή ουσία: 33% β/β, ακόρεστα οργανικά οξέα: 6% β/β, συμπυκνωμένες τανίνες (κατεχίνες): 3% β/β
pH: 6.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το TANISER είναι ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών. Περιέχει τανίνες (πολυφαινόλες φυτικής προέλευσης) και ακόρεστα οργανικά οξέα που προάγουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και παρέχουν προστασία από ακραίες συνθήκες του περιβάλλοντος. Διεγείρει τη φυτική ανάπτυξη και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων καρπών, αυξάνοντας το τελικό τους μέγεθος και τη συνεκτικότητα. Η ενίσχυση της συνεκτικότητας των καρπών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε αρκετές καλλιέργειες (π.χ. φράουλα), καθώς ενισχύει την αντοχή τους κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και αυξάνει τη διάρκεια ζωής στο ράφι (shelf-life). Το TANISER, τέλος, αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες αβιοτικού στρες).

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Εφαρμόζεται διαφυλλικά, με δόση 250-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό (250-300 κ.εκ / στρέμμα).

Χρόνος εφαρμογής:

Καλλιέργεια	Χρόνος εφαρμογής
Μηλοειδή, Πυρνόκαρπα	Από την πτώση των πετάλων (BBCH 69) έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού (BBCH 73, στάδιο 2ης καρποποίησης).
Αμπέλι	Από την πλήρη άνθηση έως την ωρίμανση.
Φράουλα (Υγιάθρου + Θερμοκηπίου)	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.
Ακτινίδιο	Προανθικό στάδιο (εμφάνιση ταξιανθίας) (BBCH 51-59).
Εσπεριδοειδή	Από την πτώση των πετάλων (BBCH 71) έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού (BBCH 85, στάδιο 2ης καρποποίησης).
Σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.τ.λ.)	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.
Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι κ.τ.λ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.
Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.

Συστήνονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



ELANCO ELLAS A.E.B.E.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2130 289 100, E-mail: contact@elanco.gr
www.elanco.gr