

ΡΕΗΥΔΡΑΡΕΕΣ

Energie

Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή για μύσους
Είδη ζώων: Μόσχοι

Ειδικός διατροφικός σκοπός: Σταθεροποίηση του ισοζυγίου νερού και ηλεκτρολυτών για την υποστήριξη της φυσιολογικής πέψης.



Σύνθεση: (8.17.1) Τυρόγαλα*(περιέχει λακτόζη στην οποία έχουν προστεθεί φυτικά λιπαρά), (13.2.2) Δεξτρόζη*, (11.4.1) Χλωριούχο νάτριο, (11.4.6) Θειικό νάτριο, (11.5.1) Χλωριούχο κάλιο, (3.2.3) Σπασμένα χαρούπια (Λοβοί χαρουπιών, αποξηραμένοι)*, (5.27.1) Πηκτίνη*, (004129-EN) Cnicus benedictus Κνίκος/Αγιάγκαθο, (11.1.6) Χλωριούχο ασβέστιο. *Πηγές υδατανθράκων.
Πρόσθετες ύλες ανά κιλό (kg): Ενώσεις ιχνοστοιχείων: 3b103 Σιδηρός (ως Μονοένυδρος θειικός σιδηρός(II)): 25 mg/kg, 3b201 Ιώδιο (ως Ιωδιδίου του καλίου): 0,4 mg/kg, 3b301 Κοβάλτιο (ως Τετραένυδρο οξικό κοβάλτιο(II)): 1 mg/kg, 3b503 Μαγγάνιο (ως Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο(II)): 20 mg/kg, 3b605 Ψευδάργυρος (ως Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος): 20 mg/kg, 3b801 Σελήνιο (ως Σεληνιώδες νάτριο): 0,45 mg/kg.
Βιταμίνες: 3a672a Βιταμίνη Α (Οξικό ρετινύλιο): 10.000 IU/kg, 3a671 Βιταμίνη D3 (Χοληκαλσιφερόλη): 5.000 IU/kg, 3a700i Βιταμίνη Ε (ρακεμικό μείγμα όλων των στερεοϊσομερών της οξικής α-τοκοφερόλης): 250 mg/kg, 3a300 Βιταμίνη C (Ασκορβικό οξύ): 50 mg/kg, 3a821 Βιταμίνη Β1 (Μονονιτρική θειαμίνη): 3 mg/kg.
Σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων: 4b1700i *Bacillus subtilis* (DSM 5750) και *Bacillus licheniformis* (DSM 5749): $3,8 \times 10^{10}$ CFU/kg.
Αισθητικές πρόσθετες ύλες: Αρωματικές ουσίες: 2b17034 Γλυκίνη: 15.000 mg/kg, 2b Μίγμα αρωματικών σύνθετων ουσιών.
Αντιοξειδωτικά: E 310 Γαλλικός προπυλεστεράς: 11 mg/kg, E 321 Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο BHT: 11 mg/kg.
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα: 1m558i Μπεντονίτη: 20.220 mg/kg, E 563 Σεπιολιθική άργιλος: 670 mg/kg.
Συντηρητικά: 1a238 Μυρμηκικό ασβέστιο: 535 mg/kg, 1a282 Προπιονικό ασβέστιο: 230 mg/kg, 1a262 Διοξικό νάτριο: 25 mg/kg, 1a330 Κιτρικό οξύ: 6 mg/kg.
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες: 6%, Ολικές λιπαρές ουσίες: 23,5%, Ολική τέφρα: 22,2%, Ολικές ινώδεις ουσίες: 0,6%, Νάτριο: 3,3%, Κάλιο: 1,6%, Χλωριούχα: 4,4%, Υδατάνθρακες: 45,5%.

Συνιστάται να περιοριστεί η συμπλήρωση με κοβάλτιο σε 0,3 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κίνδυνος έλλειψης κοβαλτίου που οφείλεται στις τοπικές συνθήκες και η συγκεκριμένη σύνθεση του διατολογίου. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για την αποφυγή έκθεσης με Κοβάλτιο μέσω της εισπνοής ή της δερματικής οδού.


Το μείγμα διάφορων πηγών μυρμηκικού οξέος, προπιονικού οξέος, οξικού οξέος και κιτρικού οξέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο σε πλήρεις ζωοτροφές για τα σχετικά είδη. Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν. Η ταυτόχρονη χρήση από το στόμα με μακρολίδια πρέπει να αποφεύγεται. Η συνολική ποσότητα μπεντονίτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 20.000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. Το μείγμα οξικού ρετινυλίου, παλμιτικού ρετινυλίου ή προπιονικού ρετινυλίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα για τα συγκεκριμένα είδη και κατηγορίες. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση με βιταμίνη D2.

Προϊόν μόνο για ζωοτροφή. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Πρέπει να διασφαλιστεί η ομοιογενής διασπορά του προϊόντος. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

1 mg ρακεμικό μείγμα όλων των στερεοϊσομερών της οξικής α-τοκοφερόλης = 1 IU.

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Εταιρεία/Παρασκευαστής:  TECHNNOVET

TECHNOVET
Z.A. de lumunoch,
200 Rue Pierre & Marie Curie,
29510 BRIEC, FRANCE
Tél.: (+33) 02 98 64 46 32.
Αριθμός Έγκρισης: aFR290270.02.



Διανομέας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 335,
152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 2130065000
Θεσσαλονίκη: Τηλ.: (+30) 2310289100
www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr
Αριθμός έγκρισης: aEL5400030
Αριθμός εγγραφής: 22200 540 000033

Κουτί με 32
φακελίσκους των
100 g

Αριθμός Παρτίδας/Batch:

Ανάλωση κατά προτίμηση
πριν από:

Οδηγίες για τη σωστή χρήση:

Συνιστώμενη πρόσληψη του έτοιμου για χορήγηση υγρού παρασκευάσματος και του γάλακτος, κατά περίπτωση: Αραιώστε/διαλύστε ένα φακελάσκο σε 2 λίτρα ζεστό νερό ή γάλα. Διανείμετε 100 έως 300 g (2 έως 3 φακελίσκους) ανά ζώο την ημέρα για να αντικαταστήσετε το γάλα ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου σας.

Σε περίπτωση κινδύνου πεπτικών διαταραχών, κατά τη διάρκεια πεπτικών διαταραχών, ή κατά την ανάρρωση από πεπτικές διαταραχές (διάρροια).

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης.

Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης: 1 έως 7 ημέρες.

Συνιστώμενη διακύμανση ηλεκτρολυτών ανά λίτρο υγρού παρασκευάσματος έτοιμου για χορήγηση ως ζωοτροφή:

Νάτριο: 1,7 g - 3,5 g, Κάλιο: 0,4 g - 2 g, Χλωριούχα: 1 g - 2,8 g.

Σε περίπτωση στερεών ζωοτροφών, το συνιστώμενο εύρος ηλεκτρολυτών θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την κανονική καθημερινή εκούσια πρόσληψη νερού.