

RUMITONYL

Συμπληρωματική ζωοτροφή για Μηρυκαστικά

Σύνθεση: (13.1.1) Προϊόντα της αρτοποιίας και της βιομηχανίας ζυμαρικών (έχουν υποστεί ζύμωση), Κίτρον το νεράντζιον ανθός, πέταλα (Νερατζιά) (Citrus aurantium amara flower, petal) (005421-EN), Ρίζα Παιώνιας (Root of Paeoniae Lactiflorae) (004767-EN), Κενταύρια (Centaurea) (001359-EN), Γεντιανή (Gentian) (001686-EN), Αρτεμισία το ασφίνθιον (Wormwood plant) (001337-EN).


Πρόσθετες ύλες ανά κιλό (kg):

Συντηρητικά: 1k281 Προπιονικό νάτριο 490.000 mg/kg,

Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα: E 551a Πυριτικό οξύ μετά από καθίζηση και ξήρανση: 10.000 mg/kg.

Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες: 3,8 %, Ολικές λιπαρές ουσίες: 1,6 %, Ολική τέφρα: 29,3 %, Ολικές ινώδεις ουσίες: 6,2 %, Νάτριο: 12,6 %.

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Εταιρεία/Παρασκευαστής: :  **TECHNOVET**

TECHNOVET

Z.A. de lumunoch, 200 Rue Pierre & Marie Curie, 29510 BRIEC, FRANCE
Tel.: (+33) 02 98 64 46 32. Αριθμός Έγκρισης: aFR29020702.

Διανομέας:



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη: Τηλ.: (+30) 2310289100

www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr

Αριθμός έγκρισης: aEL5400030

Αριθμός εγγραφής: 22200 540 000033

Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν. Το μείγμα διάφορων πηγών προπιονικού οξέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο σε πλήρεις ζωοτροφές για τα σχετικά είδη.

Καθαρό βάρος:
70 g

Αριθμός Παρτίδας/Batch:

Ανάληψη κατά προτίμηση
πριν από:

Οδηγίες για τη σωστή χρήση:

Από του στόματος. Δώστε το στο σιτηρέσιο ή στο νερό

χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή χορήγησης, φιάλη ή σωλήνα τροφοδοσίας/διατροφής.

Ενήλικα βοοειδή: 70 g (1 φακελίσκος) ανά ζώο ανά ημέρα πρωί και βράδυ για 1 έως 2 ημέρες.

Νεαρά βοοειδή: 35 g (½ φακελίσκος) ανά ζώο ανά ημέρα πρωί και βράδυ για 1 έως 2 ημέρες.

Αιγοπρόβατα: 17,5 g (¼ φακελίσκου) ανά ζώο ανά ημέρα πρωί και βράδυ για 1 έως 2 ημέρες.